

Patiënt gebruikt DOAC (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) preoperatief

Bepaal bloedingsrisico van de ingreep
(Tabel perioperatief bloedingsrisico)

Verwaarloosbaar én beperkte potentiële nadelige gevolgen van

Laag risico

Hoog risico

Continueer DOAC

Stop DOAC, afhankelijk van nierfunctie
(Nierfunctiebepaling max. 6 mnd oud)

Stop DOAC, afhankelijk van nierfunctie
(Nierfunctiebepaling max. 6 mnd oud)

eGFR	Dabigatran	Apixaban	Rivaroxaban	Edoxaban	eGFR	Dabigatran	Apixaban	Rivaroxaban	Edoxaban
≥80	24 uur	24 uur	24 uur	24 uur	≥80	48 uur	48 uur	48 uur	48 uur
51-79	36 uur	24 uur	24 uur	24 uur	50-80	72 uur	48 uur	48 uur	48 uur
30-50	48 uur	24 uur	24 uur	24 uur	30-50	96 uur	48 uur	48 uur	48 uur
<30	n.v.t.	36 uur	36 uur	36 uur	<30	n.v.t.	48 uur	48 uur	48 uur

Herstart DOAC 24 uur postoperatief bij adequate hemostase.

Herstart DOAC 48-72 uur bij adequate hemostase.
Tot die tijd: tromboseprofylaxe