Patiënt gebruikt een DOAC, (Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban of Edoxaban) preoperatief

Bepaal het bloedingsrisico van de ingreep

Laag Risico

Continueer DOAC, met laatste tablet 8 -12 uur voor de ingreep

Intermediair Risico

Stop DOAC, afhankelijk van nierfunctie. (Nierfunctie max. 6 mnd oud)

eGFR	Dabigatran	Apixaban	Rivaroxaban	Edoxaban
≥80	24 uur	24 uur	24 uur	24 uur
51-79	36 uur	24 uur	24 uur	24 uur
30 - 50	48 uur	24 uur	24 uur	24 uur
<30	nvt	36 uur	36 uur	36 uur

Herstart DOAC 24 uur postoperatief bij adequate hemostase.

Hoog Risico

Stop DOAC, afhankelijk van nierfunctie. (Nierfunctie max. 6 mnd oud)

eGFR	Dabigatran	Apixaban	Rivaroxaban	Edoxaban
≥80	48 uur	48 uur	48 uur	48 uur
51-79	72 uur	48 uur	48 uur	48 uur
30 - 50	96 uur	48 uur	48 uur	48 uur
<30	nvt	48 uur	48 uur	48 uur

Herstart DOAC 48-72 uur bij adequate hemostase.
Tot die tijd: tromboseprofylaxe